

Enfermedad Neumocócica

(Enfermedad causada por el *Streptococcus pneumoniae*)

(Pneumococcal Disease)

¿Qué es la enfermedad neumocócica?

La enfermedad neumocócica es una infección causada por la bacteria *Streptococcus pneumoniae*. También se llama *pneumococcus* y puede causar pulmonía, dolores de oído (otitis media), meningitis y otras enfermedades.

¿Cuándo ocurre?

La enfermedad neumocócica puede ocurrir en cualquier momento del año.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de fiebre e irritabilidad pueden ocurrir con cualquiera de las enfermedades causadas por los neumococos. Los síntomas de meningitis pueden incluir fiebre alta, cuello rígido y dolores de cabeza en cualquier persona mayor de 2 años de edad. En los niños pequeños, los síntomas pueden ser solamente que el bebé esté menos activo, irritable, vomite o se alimente mal.

Los síntomas de neumonía en los niños incluyen fiebre, tos, respiración rápida o gruñidos. La otitis media causa mucho dolor en los oídos y tímpanos, que están enrojecidos e inflamados. Los niños también pueden tener insomnio, fiebre e irritabilidad.

¿Es contagioso? ¿Cómo se contagia?

El neumococo se contagia por el contacto con las personas que tienen una enfermedad neumocócica o que son portadoras de la bacteria en la garganta y no están enfermas. Las pequeñas gotitas de la respiración que salen de la nariz o boca de estas personas son infecciosas.

¿Cuán grave es la enfermedad neumocócica?

La enfermedad neumocócica es muy grave para los niños pequeños. En los Estados Unidos, se estima que las infecciones neumocócicas causan 200 muertes, 700 casos de meningitis, 17,000 infecciones de sangre y 4.9 millones de infecciones en los oídos en niños menores de 5 años.

¿Cómo puede prevenirse la enfermedad neumocócica?

A pesar de que esta bacteria suele ser resistente a la penicilina, la enfermedad neumocócica puede tratarse con antibióticos. Las enfermedades neumocócicas pueden prevenirse en los niños vacunados. La vacuna Prevnar® debería aplicarse a todos los bebés menores de 24 meses de edad y a los 2, 4, y 6 meses de edad, seguida de un refuerzo a los 12-15 meses. Si un niño tiene menos de 2 años y no ha recibido nunca esta vacuna, hay programas que indican cuándo aplicar las vacunas para protegerlos. También hay una vacuna Pneumovax® para los niños mayores de 2 años, los adultos mayores de 65 años y las personas que no tienen buenos sistemas inmunológicos.

Author:

Approved by the Patient Family Education Committee

© 2006 The Children's Hospital, Denver